



PRIJEMNI ISPIT – ZDRAVSTVENA NEGA

- Generacija: 2020/21, septembarski rok -
15.09.2020. god.

Napomene:

1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom.
2. Zadatak neće biti priznat u slučaju da nije zaokruženo rešenje ili da je zaokruženo više rešenja.
3. U svim pitanjima samo je jedan odgovor tačan.
4. Maksimalno predviđeno vreme rešavanja testa je 2 sata.

Molimo Vas da navedete Vaš konkursni broj: _____

01. Koma je:

- a) faza u kojoj se bolesnik nalazi pre smrti
- b) trenutak prekidanja života bolesnika
- c) stanje poremećaja svesti koje se odlikuje patološkom pospanošću iz koje se bolesnik budi mehaničkim dražima, da bi uskoro, po prestanku nadražaja ponovo duboko utonuo u dubok san
- d) stanje poremećaja svesti u kome bolesnik tek posle više ponovljenih i veoma jakih nadražaja reaguje i pokazuje delimične znake prisustva svesti
- e) teško stanje poremećaja svesti u kome je bolesnik u dubokoj besvesti i ne reaguje ni na kakve spoljne draži, što je prognostički veoma loše

02. Mortinatalitet je:

- a) ukupan broj umrlih u odnosu na prosečan broj stanovnika
- b) broj živorođene dece u odnosu na broj umrlih
- c) broj mrtvorodene dece u odnosu na broj živorođene dece
- d) broj živorođene dece u odnosu na prosečan broj stanovnika
- e) broj mrtvorodene dece u odnosu na broj umrlih

03. Kostna srž se može dobiti:

- a) punkcijom mokraćne bešike
- b) punkcijom želuca
- c) punkcijom perikarda
- d) punkcijom grudne i ilijačne kosti
- e) abdominalnom punkcijom

04. Likvor se može dobiti:

- a) abdominalnom punkcijom
- b) punkcijom zglobova
- c) punkcijom mokraćne bešike
- d) lumbalnom punkcijom
- e) punkcijom želuca

05. Spoljni gornji kvadrant služi za aplikaciju leka, kako se ne bi oštetio nerv:

- a) n. oculomotorius
- b) n. peroneus
- c) n. ischiadicus
- d) n. medianus
- e) n. facialis





06. Epikutana aplikacija lekova podrazumeva:

- a) nanošenje na kožu ili utrljavanje
- b) aplikaciju putem digestivnog trakta
- c) aplikaciju putem respiratornog trakta
- d) aplikaciju implantacijom
- e) aplikaciju putem reproduktivnog trakta

07. Supkutano, intradermalno i intravensko unošenje leka u organizam je:

- a) enteralno
- b) parenteralno
- c) epikutano
- d) sublingvalno
- e) per os

08. Nakon operativnog zahvata u opštoj anesteziji izostanak stolice toleriše se do:

- a) 72 sata
- b) 48 sati
- c) 24 sata
- d) 12 sati
- e) 2 sata

09. Duodenalna tubaža primenjuje se radi dobijanja:

- a) sputuma za laboratorijske analize
- b) krvi za laboratorijske analize
- c) rektalnog brisa
- d) vaginalnog brisa
- e) žuči za laboratorijske analize

10. Ispiranje uha sprovodi se:

- a) kod infekcije srednjeg uha
- b) kod rupture bubne opne
- c) kod infekcije spoljašnjeg ušnog kanala
- d) kod bolesnika koji ima vrtočavicu
- e) kod bolesnika koji ima glavobolju

11. Normalna pH vrednost krvi je:

- a) 7.35-7.40
- b) 7.00-7.10
- c) 7.70-7.75
- d) 6.80-7.00
- e) 6.30-6.80

12. Normalno vreme koagulacije krvi po Li-Vajtu iznosi:

- a) 5-10 sekundi
- b) 3-9 minuta
- c) 10-17 minuta
- d) 1-2 sata
- e) 2-3 sata

13. Često mokrenje praćeno većom količinom mokraće uz osećaj pečenja naziva se:

- a) dizurija
- b) anurija
- c) polakizurija
- d) diureza
- e) oligurija



FFNS



14. Hemoptizija je:

- a) prisustvo krvi u stolici
- b) prisustvo krvi u urinu
- c) **iskašljavanje malih količina krvi u vidu žilica**
- d) prisustvo krvi u povraćenom sadržaju
- e) prisustvo krvi u vaginalnom brisu

15. Bradikardija je:

- a) normalna frekvencija disanja
- b) **usporena frekvencija srčanog rada**
- c) ubrzana frekvencija srčanog rada
- d) usporena frekvencija disanja
- e) normalna frekvencija srčanog rada

16. Koncentracija natrijum-hlorida kod fiziološkog rastvora je:

- a) 0,09%
- b) **0,9%**
- c) 1%
- d) 1,9%
- e) 9%

17. Puls predstavlja odraz srčanog rada na:

- a) centralnim arterijskim krvnim sudovima
- b) **perifernim arterijskim krvnim sudovima**
- c) centralnim venskim krvnim sudovima
- d) perifernim venskim krvnim sudovima
- e) na bilo kom krvnom sudu

18. Temperaturu možemo meriti:

- a) pod pazuhom, ispod jezika
- b) samo pod pazuhom zato što je to najsigurnija metoda
- c) samo rektalno i vaginalno
- d) samo ispod jezika
- e) **pod pazuhom, ispod jezika, rektalno, vaginalno**

19. Načini postavljanja zavoja su:

- a) **kružni, obrtni prekljeni, ukršteni i spiralni zavoj**
- b) kružni, kvadratni, trouglasti i pravougaoni zavoj
- c) primarni, sekundarni, tercijarni i kvaternarni zavoj
- d) osnovni, specijalni, kružni i otvoreni zavoj
- e) otvoreni, zatvoreni, krivi i pravi zavoj

20. Profilaksa dekubitus-a je:

- a) izlečiti osnovnu bolest
- b) presvlačiti bolesnika što češće
- c) sprečavanje povreda
- d) masaža bolesnika
- e) **održavanje lične higijene bolesnika i savesna nega kože, česta promena položaja bolesnika, poboljšanje periferne cirkulacije krvi na delovima tela koji u postelji trpe pritisak, zaprašivanje kože puderom, potreba pomoćnih sredstava, upotreba specijalnih dušeka**

21. Da bi se sterilisao vazduh u operacionoj sali UV lampe treba da budu uključene:

- a) 2-6 sati
- b) 6-12 sati
- c) **12-18 sati**
- d) 18-24 sata
- e) 24-48 sati





22. Hemijsko sredstvo za dezinfekciju nije:

- a) 70% etil-alkohol
- b) 3% hidrogen
- c) jod
- d) kalijum-permanganat
- e) UV zračenje

23. Febris kontinua je:

- a) tip visokofebrilne temperature, kod koje se dnevne oscilacije kreću u okviru 1°C
- b) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije uvek veće od 1°C, ali minimalna temperatura nikada ne pada ispod 37°C
- c) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije od 2-3°C
- d) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije od 2-4°C
- e) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije od 2-5°C

24. Antisepsa je:

- a) skup mera i postupaka kojima se otklanjaju mikroorganizmi sa bolesnika i njegove okoline
- b) skup mera i postupaka kojima se uništavaju insekti
- c) skup mera i postupaka kojima se otklanjaju gljivične infekcije
- d) skup mera i postupaka kojima se uništavaju glodari
- e) skup mera i postupaka kojima se otklanjaju zagađenja iz životne sredine

25. Odojčetu koje se hrani na flašicu najbolje je staviti kapi u nos:

- a) neposredno pre obroka
- b) 20 minuta pre obroka
- c) odmah posle obroka
- d) 30 minuta posle obroka
- e) svejedno je u koje vreme

26. Telesna masa meri se:

- a) antropometrom
- b) vagom
- c) termometrom
- d) aparatom za merenje krvnog pritiska
- e) spektrofotometrom

27. Bolesnici koji imaju spoljašnje ili unutrašnje krvarenje smeštaju se:

- a) u odeljenje dermatologije
- b) u odeljenje ginekologije
- c) u hirurško odeljenje
- d) u odeljenje kardiologije
- e) u odeljenje pulmologije

28. Zdravstvena nega se bavi:

- a) zdravim pojedincem
- b) bolesnim pojedincem
- c) porodicom i društvenom zajednicom
- d) zdravim i bolesnim pojedincem, porodicom i društvenom zajednicom
- e) zdravim pojedincem i porodicom

29. Zdravstvenu delatnost na primarnom nivou obavlja:

- a) dom zdravlja
- b) opšta bolnica
- c) kliničko-bolnički centar
- d) apoteka
- e) institute





30. Termin „*primum non nocere*“ znači:

- a) prvo pomoći
- b) prvo ublažiti bol
- c) prvo zaustaviti krvarenje
- d) prvo ne naškoditi**
- e) prvo razgovarati

Želimo Vam uspešno polaganje prijemnog ispita!

